

Bilag 1. Insektanalyse, Købmagergade 44-46 og 50, KBM 4365

Prøve

| Taxon | Ecology | P855 | P857 | P1531 |
|---|---------|------|------|-------|
| Carabidae (løbebiller) | | | | |
| <i>Acupalpus meridianus</i> (L.) Almindelig Moseløber | Df | | | 1 |
| <i>Bembidion</i> sp. | | | | 1 |
| <i>Pterostichus anthracinus</i> (Illiger) Kulsort Jordløber | St, Vm | | | 1 |
| <i>Pterostichus melanarius</i> (Illiger) Markjordløber | Df | | | 1 |
| Helophoridae (slamvandkærer) | | | | |
| <i>Helophorus minutus</i> (F.) | Akv | | | 1 |
| Hydrophilidae (vandkærer) | | | | |
| <i>Cercyon pygmaeus</i> (Illiger) Dværglandkær | Og | | 1 | |
| Leiodidae | | | | |
| <i>Catops</i> sp. | Åd | 1 | | |
| Staphylinidae (rovbiller) | | | | |
| <i>Coprophilus striatulus</i> (F.) | Gr, Sy | 1 | | |
| <i>Philonthus</i> spp. | | 1 | 1 | 1 |
| <i>Xylodromus</i> sp. | | | | 1 |
| Scarabaeidae (torbister) | | | | |
| <i>Aphodius</i> sp. | Gr | | | 1 |
| Ptinidae (borebiller) | | | | |
| <i>Anobium punctatum</i> (DeGeer) Almindelig Borebille | St, Tdd | | | 1 |
| <i>Ptinus</i> spp. | St | 1 | | 1 |
| Nitidulidae (glansbiller) | | | | |
| <i>Meligethes cf. aeneus</i> (F.) Glimmerbøsse | En, Df | | | 1 |
| Endomychidae (svampehøns) | | | | |
| <i>Mycetaea subterranea</i> (Marsham) | Sy | | | 1 |
| Mycetophagidae (svampebiller) | | | | |
| <i>Triphyllus bicolor</i> (F.) | Sb, St | | | 1 |
| Curculionidae (snudebiller) | | | | |
| <i>Sitophilus granarius</i> (L.) Kornsnudebille | Sy, Sik | 1 | 1 | 2 |
| Diptera (tovinger) | | | | |
| Indet. puparium | | 2 | 2 | 1 |
| Chironomidae (dansemyg) | | | | |
| <i>Chironomus anthracinus</i> -type | Akv | | | 11 |
| <i>Chironomus plumosus</i> -type | Akv | | | 20 |
| Sepsidae (svingefluer) | | | | |
| <i>Nemopoda nitidula</i> (Fallén) | Gr, Åd | | 1 | |
| Agromyzidae (minérfluer) | | | | |
| <i>Melanagromyza</i> sp. | | 1 | | |
| <i>Phytomyza</i> sp. | | | | 2 |
| Chloropidae (fritfluer) | | | | |
| <i>Oscinella frit</i> (L.) Almindelig Fritflue | Df, En | | | 2 |
| <i>Meromyza</i> sp. | | | | 1 |
| Sphaeroceridae (springfluer) | | | | |
| Limosiniinae spp. | Gr | 3 | 2 | 3 |
| Carnidae | | | | |
| <i>Meoneura</i> sp. (Fallén) | Gr | | 1 | |
| Ephydridae (vandfluer) | | | | |
| <i>Hydrellia</i> sp. | | | | 1 |
| Andet | | | | |
| Mider (Acari) | | x | x | x |
| Fiskeknogler | | x | x | x |
| Pattedyrsknogler | | x | x | x |
| Knogler fra frøer/tudser | | | | x |
| Fugleknogler | | | | |
| Sneglehuse | | | | |